




लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिंसार



पशुओं में टीकाकरण

पशु रोग	प्रथम टीका	बूस्टर टीका	पुनः टीकाकरण
गाय और भैंस			
मुँह खुर एवं गलधोटू	4 माह और अधिक	आवश्यक नहीं	प्रति छ: माह के अंतराल पर
बूमेलोसिस	4-8 माह (केवल बछियों /कटड़ियों को)	आवश्यक नहीं	कोई नहीं
लंगड़ा बुखार	4 माह और अधिक	आवश्यक नहीं	प्रति वर्ष

भेड़ एवं बकरी

मुँह खुर रोग	4 माह और अधिक	प्रथम टीके के 9 महीने बाद	प्रति वर्ष
गलधोटू	6 माह और अधिक	आवश्यक नहीं	प्रति छ: माह के अंतराल पर
माता रोग	3 माह और अधिक	आवश्यक नहीं	प्रति वर्ष
पी. पी. आर	4 माह और अधिक	आवश्यक नहीं	प्रति 2 वर्ष
फड़किया (एंटेरोटोक्सिमिया)	3 माह और अधिक	प्रथम टीके के 2 सप्ताह बाद	प्रति वर्ष

शूकर

शूकर ज्वर	2-3 माह	प्रथम टीके के 1 महीने बाद	प्रति छ: माह के अंतराल पर
मुँह खुर रोग	2 माह	आवश्यक नहीं	प्रति छ: माह के अंतराल पर

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पशु हस्पताल से संपर्क करें।

पशुचिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं जानपर्दिक रोग विज्ञान विभाग